



Aviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

25 mag 26

SITUAZIONE Il presente bollettino viene messo solo in forma sintetica per contingenti problematiche tecniche

Si confermano le indicazioni del precedente bollettino nr 5. Stiamo assistendo a giornate estive con temperature straordinarie in crescendo a partire dai 30°C del 22.5. Non è escluso che tra domani e giovedì avremo notti tropicali. Anche l'umidità relativa dell'aria è stata su valori (medi) piuttosto contenuti, dell'ordine anche inferiore al 60%. Confermata altresì netta accelerazione dell'avanzamento della fioritura su tutti i vitigni (in coda la croatina) con Nebbiolo anche verso l'allegagione nelle posizioni più precoci. La fase temporalesca è stata ridimensionata e spostata da domenica

OIDIO e PERONOSPORA

Si conferma una situazione di rischio complessivamente molto basso, seppur l'Oidio meriti attenzione preventiva su vigneti/vitigni particolarmente predisposti o soggetti in passato data la concomitante fase fenologica a cavallo della fioritura già menzionata di estrema sensibilità

INTERVALLO DATA

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

ASSOLUTAMENTE ENTRO

TRA DOMANI E GIOVEDÌ

27-28 MAGGIO

!!!! ATTENZIONE !!!!!

ATTENZIONE! FONDAMENTALE GARANTIRE UNA COPERTURA ANTIOIDICA, ANCHE SOLO CON ZOLFO IN POLVERE (RAMATO) A NON PIÙ DI 14 GIORNI DAL PRECEDENTE INTERVENTO CON QUESTO TARGET. In tal caso, COME GIÀ INDICATO, UTILIZZARE DOSAGGI AD ETTARO RIDOTTI SU 20 KG DATI I PICCHI DI TEMPERATURA PROSSIMI AI 35 GRADI

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE

UNA A SCELTA TRA LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATTAMENTI/ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SL= SENZA LIMITE \$ INDICA S.A. Candidata alla Sostituzione\$

<<<<<< SI RICORDA: NELLE MISCELE ESTEMPORANEE SONO AMMESSI AL Max 2 S.A. ESCLUSO RAME E INDUTTORI SISTEMICI INDICATI IN 3** (IDEM VALE PER I COMBO.PACK) >>>>>>

7 ZOAXAMIDE (4)

EVENTUALMENTE IN MISCELA CON 10**OXATHIAPROLIN** (2MAX SEMPRE IN MISCELA)

OPPURE FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI P.ORGANICI DI COPERTURA (8 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO): TRA , FLUAZINAM(3), DITHIANON (4) FOLPET(SL).

in alternativa

OPPURE 1 \$ FLUOPICLIDE \$** (2) (2MAX INCROCIATI CON METALAXIL) DA USARE SEMPRE IN ASSOCIAZIONE CON ALTRI PARTNERS

SE COMPATIBILE E NON GIÀ IN FORMULAZIONE UTILE PROSEGUIRE RINFORZO CON L'AGGIUNTA DI

, FAMIGLIA/GRUPPO: "INDUTTORI SISTEMICI": (8 TRATT. COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL-AL; FOSFITO DI POTASSIO-K-, FOSFO.TO DI DISODIO-Na-. TUTTI SENZA LIMITE (SL) DA QUEST'ANNO.

PER L'OIDIO PROSEGUIRE NELL'ALTERNANZA TRA

4 FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). \$ DIFENO \$ / \$ TEBU \$- CONAZOLO (1 AL MAX ALTERNATIVI)

5 FAMIGLIA/ GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO) : AZOXY (2)/TRIFLOXY(3)- PYRACLO(3)/ STROBYN

Nei vigneti con allegagione avanzata, di Nebbiolo in particolare possibile infine il ricorso a

8 FAMIGLIA/GRUPPO: SDHI (2 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : FLUXAPYROXAD(2); BOSCALID (1MAX) MEGLIO RISERVARE L'UTILIZZO DI QUEST'ULTIMO FUNGICIDA IN FASE DI PRE-CHIUSURA GRAPPOLO

SE NON GIÀ IN FORMULAZIONE AGGIUNGERE ZOLFO A BASSI DOSAGGI PREFERIBILMENTE IN FORMULAZIONE LIQUIDA CON MAGGIOR RESISTENZA AL DILAVAMENTO (ATTENZIONE CON DITHIANON)

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI