

9

Cavaglio d'Agogna Sesto
 M...
 P...
 M...
 M...
 M...
 M...
 M...
 M...
 M...
 M...
 M...
 M...

VIGNAIOLI
PIEMONTESE

Città europea
 del vino 2024
 European Wine City 2024

Avviso Tecnico Difesa Integrata Obbligatoria VITE

1 lug 26

SITUAZIONE

Si è appena chiusa la seconda metà del mese di giugno con record assoluto di caldo in Piemonte. Dal 17 è iniziata l'ondata di calore, probabilmente più anticipata e lunga di sempre. Scarsi apporti pluviometrici mensili con variazioni dai 25 mm di Briona ai 60-70 delle zone centrali di Sizzano-Fara. Ad oggi non si evidenziano ancora situazioni serie da stress idrico/termico, salvo un contenimento (benefico) del vigore vegetativo. La vite ha proseguito spedita verso l'esordio dell'invaiatura con primi riscontri a giugno a riprova di un anticipo da record che scalzerà il precedente del 2022. A breve è atteso un passaggio temporale molto incerto, a seguito del quale è previsto il ripristino di condizioni stabili con temperature in crescendo ma almeno contenute entro i 35 °C e discreto(r) rinfresco notturno con beneficio anche per tutti noi, finalmente, non solo per la vite.

INVAIATURA VESPOLINA NEI VIGNETI PIÙ PRECOCI ATTESO ENTRO IL 10 LUGLIO

PERONOSPORA ED OIDIO

RISCHIO

Resta una situazione di rischio/riscontri molto contenuti, per entrambi i patogeni e specificamente medio basso per l'Oidio. Si ricorda che il grado di sensibilità delle bacche agli attacchi è calante al procedere del loro sviluppo e si conclude al compimento dell'invaiatura (resistenza ontogenetica)

Si consiglia: **TRA GIOVEDÌ 2 E DOMENICA 5 RINNOVARE la copertura rispettando l'intervallo massimo di 14-15 gg per la protezione antioidica**

Fare fare ricorso a f.c. contenenti Zolfo in formulazione bagnabile o bicarbonato di potassio, p.a. quest'ultimo che può esplicare, nelle condizioni che si prospettano, un'attività preventiva generale antifungina.

In aggiunta, in copertura antiperonosporica ricorre a formulati rameici a maggior persistenza ai dosaggi minimi di etichetta. Si rammenta che sono considerati già ampiamente efficaci a tutti gli effetti di difesa apporti di rame metallo ad ettaro di 200 grammi. Pertanto un prodotto che contiene il 25% di rame, salvo indicazioni di etichetta, può essere utilizzato tranquillamente a dosaggi di 1 kg/ha

Utilissimo in questo contesto l'eventuale ricorso a formulati (micro) biologici già elencati nei precedenti bollettini tanto più se multi-target

ALTRI CONSIGLI

ATTENZIONE ALLA GESTIONE DELLE SFOGLIATURE. L'ANNATA PRESENTA TUTTE LE CARATTERISTICHE AFFINCHÉ SI MANIFESTINO STRESS IDRICI E TERMICI SU GRAPPOLI, TANTO PIÙ SE TROPPO ESPOSTI. SI SONO GIÀ MANIFESTATI DANNI A PARTIRE DAL 15 GIUGNO CON I PRIMI INNALZAMENTI DELLE T SOPRA I 35°c

INTERROMPERE ASSOLUTAMENTE LA SFOGLIATURA IN QUESTA FASE DI PRE INVAIATURA

TRINCIATURA DEL COTICO ERBOSO: REGOLARE CORETTAMENTE LA BARRA PER NON ESEGUIRE TAGLI TROPPO A RASO. SI RICORDA OBBLIGO DI SFALCIO A FILARI ALTERNI (SALVO AL MOMENTO DELL'ESECUZIONE DEI TRATTAMENTI INSETTICIDI COME DI SEGUITO SPECIFICATO)

SECONDO. INSETTICIDA OBBLIGATORIO PER FLAVESCENZA DORATA/POPILLIA JAPONICA . ATTENZIONE SINTOMI LAMPANTI DI FLAVESCENZA IN AUMENTO!!

PER LE AZIENDE IN DIFESA INTEGRATA: SEGUE APPOSITO BOLLETTINO IN 2ª PAGINA

BOLLETTINO EMESSO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESE

TUTTE LE INDICAZIONI SUI PRINCIPI ATTIVI, AVVERSAITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSAITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).